

# 中藥鉤藤可緩柏金遜病



■李敏指，研究讓醫學界更深入認識中醫藥。

隨着年紀漸長，長者腦部衰退會患上柏金遜症，影響身體活動能力，浸大中醫藥學院研究發現，中藥「鉤藤」中的主要有效成份「異鉤藤鹼」可改善柏金遜症病人的病徵，同時減輕因服食西藥而引起的副作用。學院表示，研究成果讓世界醫學界更深入認識中醫藥的效用和安全性。

本報記者

**中**醫藥學院研究人員在○七年至○九年間，進行了以含有「鉤藤」的中藥複方治療柏金遜症的先導性臨牀試驗研究，發現其成份「異鉤藤鹼」可誘導自噬現象，清除積聚於大腦內導

致柏金遜症的異常蛋白，並提供能量保護神經。

## 減服西藥副作用

在臨牀試驗中，病人每天如常服用西藥，當中部份人另服中藥複方沖劑，另一部份人則服用安慰劑，發現服用中藥的病人，其因西藥引起的副作用如抑鬱、睡眠

障礙、食欲下降等病症，都得到顯著改善。研究人員正進行第二階段的臨牀研究。

浸會大學中醫藥學院副教授李敏博士表示，研究結果不但為「鉤藤」在柏金遜症的治療提供了現代藥理學依據，更讓世界醫學界對中醫藥的效用和安全性有更深入的认识。